

PPI/Pcab剤 (内服薬)	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	胃潰瘍 (GU)	ランソプラゾールOD錠 (小児はエソメプラゾール Mg水和物のみ適応)	エソメプラゾールMg水和物Cp ポノプラザンフマル酸塩錠	
	十二指腸潰瘍 (DU)			
	逆流性食道炎		エソメプラゾールMg水和物Cp	
	吻合部潰瘍			
	Zollinger-Ellison症候群			
	非びらん性胃食道逆流症			
	低アスピリン投与時のGU、DUの再発抑制	ランソプラゾールOD錠	エソメプラゾールMg水和物Cp ポノプラザンフマル酸塩錠	
NSAIDs投与時におけるGU、DUの再発抑制				
H2遮断内服薬	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・OD錠 (散剤投与が必要な場 合： ファモチジン散)	ラフチジン錠	
	胃炎・慢性胃炎の急増悪期の胃粘膜病変（びらん・出血・発赤・浮腫）の改善		ニザチジン錠	
	吻合部潰瘍		ラフチジン錠	
	上部消化管出血・Zollinger-Ellison症候群			
	麻酔前投薬	ラフチジン錠		
スタチン剤	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	高脂血症	プラバスタチンナトリウム錠		
	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症	ロスバスタチン錠・OD錠 (10歳以上の小児はピタ	ピタバスタチンカルシウム錠・OD錠 アトルバスタチン錠	
フィbrate系高脂血症薬	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	高脂血症	ベザフィbrate徐放錠 フェノフィbrate錠	ペマフィbrate錠	
尿酸生成阻害薬	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	痛風	フェブキソスタット錠	トピロキソスタット錠	
	高尿酸血症	アロプリノール錠		
	がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠		
がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠			
降圧薬 (ARB)	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	高血圧症	オルメサルタン錠・OD錠・テルミサルタン錠・OD錠・カンデサルタン錠・OD錠(1歳以上の小児は、カンデサルタン錠・OD錠)	アジルサルタン錠	
	腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・OD錠		
	ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全 高血圧及び蛋白尿を伴う2型DMのDM性腎症	ロサルタンカリウム錠		
降圧薬 (ACE)	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	
	(本態性) 高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠 (散剤投与が必要な場 合：エナラプリルマレイン塩細粒1%)	イミダプリル塩酸塩錠 ペリンドプリルエルブミン錠	
	腎性高血圧症		イミダプリル塩酸塩錠	
	腎血管性高血圧症			
	悪性高血圧症			
	慢性心不全			
糖尿病性腎症 (I型糖尿病)	イミダプリル塩酸塩錠			
ビスホスホネート製剤	効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
	骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg (週1回投与)	リセドロン酸Na錠17.5mg (週1回投与)	ミノドロン酸錠 50mg (4週1回投与)